

BADISTER BIPUSTULATUS VERSUS LACERTOSUS
(Coleoptera, Carabidae)

(Guy HAGHEBAERT)

In het vorig nummer van Phegea (Jg. 11, nr. 1 : 16) meldde de heer R. GOOSSENS de vangst van een afwijkend exemplaar van Badister lacertosus Sturm, welke hij een monstrositeit met rechte hoefijzervlek noemde. In de "Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands" door P. KÜHNNT vond ik dit individu beschreven als suturalis S., een aberratie van de soort B. bipustulatus F.

In dezelfde tabel wordt lacertosus eveneens als aberratie vermeld bij bipustulatus, maar rekening houdend met het feit dat het werk van KÜHNNT uit de beginjaren 1900 dateert en B. lacertosus pas in de zestiger jaren als soort beschouwd werd, kan er van verwarring geen sprake zijn.

Ikzelf vond een aberratie van B. bipustulatus F., nl. microcephalus Steph., in kreupelhout van het natuurreservaat het Zwin te Knokke (West-Vlaanderen) op 28-12-1980.

Het groot aantal variaties en aberraties wijst erop dat deze soorten tot een groep behoren die zich nog in het evolutieproces bevindt, waarbij diverse componenten nog niet vastgesteld en gescheiden zijn.

Linkerdekschild der betreffende Badister-soorten



B. bipustulatus



ab. suturalis



ab. microcephalus

G. HAGHEBAERT : Zeedijk 155, B-8400 Oostende.